

Klient information filler

En ikke permanent filler til udglatning af hudens rynker og furer

Hvad er filler?

Filler er en steril gel, bestående af hyaluronsyre, som naturligt findes overalt i vores bindevæv. Hyaluronsyre har en stor evne til at binde væske i huden, og dermed give fylde, og efterlader huden mere spændstig. Hyaluronsyre anvendes til at udfylde rynker, furer og give huden et boost.

Hvorfor injicere filler?

Med alderen reduceres mængden af hyaluronsyre i huden, og huden bliver mere slap og tynd, og vil begynde at trække ned ad. Når filler injiceres i furer og folder, udfyldes og glattes disse ud.

Da produktet findes i vores hud, vil det injicerede filler integrere med det omgivende væv, og vitale næringsstoffer vil passere frit igennem gelen. Effekten vil gradvist aftage.

Hvordan foregår behandlingen?

Huden renses og desinficeres. Den krystalfarvede gel injiceres i huden i små mængder med en tynd nål. Behandlingen vil typisk vare fra 30-60 min.

Huden kan inden behandlingen evt. smøres med noget lokalbedøvende creme.

Efter behandlingen

Efter behandlingen er det naturligt forekommende at være øm, rød og hævet.

Denne reaktion vil typisk aftage fra timer til højst et par døgn.

Ved læbe behandling hæver man typisk lidt mere op, og hævelsen vare her lidt længere.

Man kan tage på arbejde dagen efter.

Man må anvende make-up 4 timer efter behandlingen.

Hvor længe holder behandlingen?

Holdbarheden afhænger af mange forskellige faktorer, fx hudens struktur, hudens blodcirkulation, den ønskede perfektionsgrad, samt produktmængde, og injektionsteknik.

Erfaringen viser, at opfølgingsbehandlinger forlænger holdbarheden.

Man kan regne med en holdbarhed på mellem 4-6 mdr, ved læbe behandling, skal man typisk have lidt flere behandlinger.

Forventet resultat

Resultatet er meget afhængigt af, hvor dyb rynken er, årsagen til rynken, alder, hudens struktur, hvor rynken er og fastheden. Det er derfor vigtigt, at vi sammen drøfter det forventede resultat inden behandlingen udføres.

Bivirkninger og komplikationer

Almindelige bivirkninger – Hos mellem 1 og 10 af de 100 behandlinger

- Risiko for blå mærker
- Rødme, ømhed og hævelse
- Kan forekomme ujævnheder frem til produktet er integreret i vævet

Sjældne bivirkninger – Hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlinger

- Der kan opstå rødme i huden, som kan vare flere måneder
- Risiko for infektion
- Risiko for dannelse af granulomer (bindevævsknuder under og i selve huden)
- Hvis en arterie fyldes med filler, som følge af behandlingen, kan der opstå vævsdød i det behandlede område, hvorved man straks skal få det opløst med hyalase i klinikken.

Udfærdiget 1/01-2023

Ansvarshavende læge: Chris Hedeman Andersen

Medhjælpende sygeplejerske: Katja Caglak